

Informácia Vtáčia chrípka

Vírus vtácej chrípky je vírusové prenosné ochorenie vtákov, hydiny, prípadne iných zvierat, ktoré často končí uhynutím.

Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita, pokles v príjme potravy a vody, klesne produkcia vajec, postihnuté jedince majú našuchorené perie. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov. Ďalej sa vyskytujú aj poruchy tráviaceho (hnačky) a nervového systému (kíče, poruchy pohybu, strata plachosti). Tieto príznaky sa vyskytujú ojedinele alebo v kombinácii. Inkubačná doba sa pohybuje od niekoľko hodín do 7-14 dní.

Prenos vtácej chrípky na človeka je možný priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s infikovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Vírusy vtácej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, riziko prenosu je hlavne u ľudí prichádzajúcich sa do styku s vtákmi (domácimi alebo voľne žijúcimi).

V prípade, že pozorujeme uhynuté vtáctvo je nutné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,
- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (Tel.: 0905875136, 031/552 4870)
- pri prípadnej manipulácii s chorým alebo uhynutým vtákom je nutné používať osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavice, tvárovú masku, okuliare, ochranný plášť, nepremokavú obuv).

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav
- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho obvodného lekára.

Chovatelia hydiny al. iného vtáctva musia zabezpečiť dezinfekciu a hygienu chovných priestorov. Hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu. Vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku.

Zároveň RVPS DS zakázala premiestňovanie a zhromažďovanie hydiny a vtákov chovaných v zajatí, konanie trhov a výstav.